



ماد بروش ادماركيتنج ايجنسى ش.ذ.م.م.

CLIENT: MUNDI PHARMA PROJECT: BETADINE SORE THROAT 24 LOZENGES – H&L – LEAFLET

CODE: - LAETUS CODE: -

EDITION: 04 DATE: 16/10/2021

DIMENSION: 140mm x 210mm

COLORS: ● Black

BETADINE® SORE THROAT LOZENGES (HONEY & LEMON)

Please read the insert before use. For further information, please contact your doctor or pharmacist.

1. Product Description

Active ingredients

Amylmetacresol 600mcg and Dichlorobenzyl alcohol 1.2mg.

Composition

Levomenthol, Sucrose, Liquid Glucose, Honey Flavor, Lemon Flavor, Color Caramel, Purified Water.

2. Product Appearance

Brownish-yellow, round and bevelled lozenge.

3. What is this medicine used for?

Betadine® Sore Throat Lozenges effectively soothes sore throats and helps kill bacteria which can cause sore throat and mouth infections.

4. How much and how often should you use this product?

Suitable for adults and children from 6 years onwards. Dissolve one Betadine® Sore Throat Lozenges slowly in the mouth every 2 to 3 hours or as required. Do not take more than 12 lozenges in 24 hours. If symptoms persist, please consult your doctor.

5. What should you do if you miss a dose?

Skip the missed dose and take Betadine® Sore Throat Lozenges whenever you need relief from a sore throat.

6. When should you consult your doctor?

Consult your doctor and discontinue use immediately if your symptoms do not improve or if your symptoms worsen.

7. When should you not take this medicine?

This medicine should be avoided:

- (1) In children under 6 years of age
- (2) If you are allergic to any of the ingredients

Betadine® Sore Throat Lozenge should not be taken by pregnant or breast feeding mothers and diabetic patients unless advised by your doctor.

8. Undesirable effects

Ask your doctor or pharmacist for advice if you notice any of the following:

- Irritation or sensitivity in the mouth
- Allergic type of reactions

9. What other products you should avoid whilst taking this medicine?

There is no known significant interactions with other medications.

10. Signs & Symptoms of overdose

Minor gastrointestinal discomfort may occur, in which treatment is symptomatic. In case of accidental over-dosage of large quantities of the product, consult your doctor immediately.

11. What you should note when taking this medicine?

If your sore throat does not improve or becomes worse and is accompanied by a fever, see your doctor immediately.

12. How should you keep this medicine?

Store below 30°C.

Keep out of reach of children.

Shelf life is 36 months

13. Pack content:

8, 24 or 36 lozenges

14. Manufactured by:

Makson Healthcare Pvt. Ltd.

6-A, Sector-D, Industrial Area, Mandideep Distt. Raisen – 462046

15. Manufactured for:

Mundipharma MEA GmbH, St.Alban-Rheinweg 74, 4020 Basel, Switzerland.

16. Date of revision

July 2018

®: BETADINE is a registered trade mark of Mundipharma. This product is povidone iodine free

بيتادين® أقراص للتهاب الحلق غسل وليمون

يرجى قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلاني.

1. وصف المنتج

المادة الفعالة
أميلميதாகريسول 600 ميكروجرام، بنزيل كلورو كحول ثنائي 1.2 مجم.

التركيب

ليفومينثول، سكروز، جلوكوز سائل، نكهة العسل، نكهة الليمون، لون كاراميل، ماء نقي

2. شكل المنتج

أقراص مسطوفة الجانبين ودائرية الأطراف، صفراء مائلة إلى البني.

3. لم يستخدم هذا الدواء؟

بيتادين® أقراص للتهاب الحلق لها تأثير فعال في تخفيف التهاب الحلق، وتساعد على قتل البكتيريا التي قد تسبب التهاب الحلق وعدوى الفم.

4. ما مقدار الجرعة وعدد الجرعات التي ينبغي لك تناولها من هذا المنتج؟

هذا المنتج مناسب للأطفال والبالغين والأطفال بدءاً من 6 سنوات. استعمل قرص بيتادين® أقراص للتهاب الحلق ببطء كل 2-3 ساعات أو حسب الحاجة. لا تتناول أكثر من 12 قرصاً خلال 24 ساعة. إذا استمرت الأعراض، يرجى استشارة طبيبك.

5. ما الذي ينبغي لك فعله إن نشيت تناول الجرعة؟

تجاوز الجرعة الفائتة وتناول بيتادين® أقراص للتهاب الحلق عند الحاجة لتخفيف من حدة التهاب الحلق.

6. متى ينبغي لك استشارة طبيبك؟

استشر طبيبك وتوقف فوراً عن تناول الأقراص إن لم تتحسن حالتك أو ازدادت الأعراض سوءاً

7. متى ينبغي لك الامتناع عن تناول هذا الدواء؟

ينبغي عدم تناول هذا الدواء في الحالات التالية:

- 1 - للأطفال الأقل من 6 سنوات
- 2 - إن كنت تعاني من الحساسية لأحد مكونات هذا الدواء

لا ينبغي للحوامل أو المرضعات أو مرضى السكري تناول بيتادين® أقراص للتهاب الحلق إلا إذا وصفه الطبيب.

8. آثار غير مرغوبة

استشر طبيبك أو الصيدلاني إذا لاحظت أيًا مما يلي:

- تهيج أو حساسية في الفم
- تحسس لأحد تفاعلات الدواء

9. ما المنتجات الأخرى التي ينبغي تجنبها عند تناول هذا الدواء؟

لا توجد تداخلات مهمة معروفة عند استخدام هذا الدواء مع أدوية أخرى.

10. العلامات والأعراض عند تجاوز الجرعة المحددة

قد يحدث ارتفاع معدني معوي ثانوي، يمكن معالجته أعراضه. في حال تناول جرعة زائدة بشكرعرضي، استشر طبيبك فوراً.

11. ما الذي ينبغي لك ملاحظته عند تناول هذا الدواء؟

إن لم يتحسن التهاب الحلق، أو تفاقم حالته وضاعبه ارتفاع في درجة حرارتك، فاستشر طبيبك فوراً.

12. كيف يحفظ هذا الدواء؟

تحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

مدة الصلاحية 36 أشهر.

13. محتوى العبوة

8، 24، أو 36 أقراص.

14. الشركة المصنعة

شركة ماكسون الخاصة للرعاية الصحية (ذ.م.م.)

6-A, Sector-D, Industrial Area,

Mandideep Distt.

Raisen – 462046

15. صنع لصالح:

Mundipharma MEA GmbH,

St.Alban-Rheinweg 74,

4020 Basel,

Switzerland.

16. تاريخ المراجعة: يوليو 2018

®: بيتادين هي علامة تجارية مسجلة موندفي فارما. هذا المنتج الحالي من بوفيدون اليود

MA LOHO PL ME 01